


LA TORSION DE ESTOMAGO

Con este artículo solo pretendemos contar nuestra experiencia con un caso de torsión de estómago que ha padecido nuestra hembra Caoba, la finalidad no es otra que la intentar ayudar a otros posibles propietarios de perros que se pudieran encontrar con un caso parecido al nuestro.

Breve descripción de la Torsión de Estómago Canina. La temida Torsión de Estómago es una afección extremadamente grave, sobretodo si no se detecta a tiempo y la única posibilidad de curación es la intervención quirúrgica. Consiste en que el estómago da un vuelta sobre sí mismo, con lo cual tanto el conducto de entrada como el de salida del estómago quedan cerrados, afectando incluso al riego sanguíneo del mismo, (Imaginad una manguera de riego a la cual le damos una vuelta, el resultado es que cortamos la circulación del agua en su interior), esta oclusión del estómago provoca que los gases que se generan en su interior no se puedan evacuar, con lo que se genera una gran presión en el interior del estómago por ende en el interior del perro, cortando el riego sanguíneo y con resultados fatales para la vida del animal, todo esto ocurre a mucha velocidad y debemos reaccionar lo mas rápidamente posible.



Paso a narraros cronológicamente lo que le ocurrió a Caoba:

- Domingo, 8,30 H. Caoba sale al jardín a dar su paseíto mañanero hasta ahí todo normal, le doy de comer (Caoba come en 2 veces al día, mañana y noche, precisamente en prevención de la Torsión) come con su apetito habitual, visto y no visto, bebe y todo normal.
- 9:45 h Observo que le dan un par de pequeñas arcadas, no saca nada, pienso que habrá comido hierba (muchas veces lo hacen y a veces les provocan algo de vómitos), llamo a mi mujer y le digo que la baje al jardín, por si necesita devolver.
- 9:50 h Mi mujer me dice que Caoba está intentando devolver pero no puede y que la ve mal. Mi cabeza ya no para de dar vueltas pensando que puede ser, ya entonces pienso en la "Maldita Torsión", pero tampoco Caoba ha realizado ninguno de los factores de riesgo (Comer ó beber más de la cuenta, hacer ejercicios violentos, saltar etc.), Mi mujer ya ha observado que su tripa está tensa y abultada, le toco y parece que se haya tragado una pelota de playa, (Sólo habían pasado 15 min.) llamo a mi veterinario, y me dice que está fuera de Alcañiz, le comento los síntomas y me confirma mis sospechas y me indica que salga a todo correr a Zaragoza al Hospital Universitario.
- 10:00 h Salgo con Caoba hacia Zaragoza, la pobre no se puede ni sentar, supongo que debido a la presión, apoya su cabeza en mi pierna y así hacemos el viaje, de cuando en cuando parece que quiere devolver, pero sin resultado.
- 11.00 h Llegada al hospital, me están esperando, el Dr. Veterinario la palpa y me comenta que tiene todos los síntomas, le golpea con los dedos en el costado a la altura del estómago y efectivamente suena a balón de playa, pruebas radiografías etc. y a quirófano.
- 16.00 h La intervención ha sido un éxito, no obstante el Dr. Nos dice que casi todos los perros salen de la intervención, pero que la supervivencia está alrededor del 50% dentro de las siguientes 48 horas, puesto que no se sabe cual es la incidencia en el resto de los órganos, nos dice que el factor tiempo es fundamental.

- 16.00 h Del día siguiente, salimos con Caoba a pasear, es importante que realice sus necesidades de forma natural, la pobre hasta anda con dificultad, pero al final hace sus necesidades, bravo. Tiene un cicatriz en la tripa de más de 20 puntos (30 cm).
- 16.00 h Martes, vamos a recogerla, el cambio es radical, tira de la correa, no titubea al andar, vuelve a ser Caoba.
- Llegamos a casa y ya está ella como si no hubiera pasado nada, la tenemos que controlar, puesto que si no ella es como si no tuviera nada. Gracias a Dios ha pasado todo para bien.

Con todo lo ocurrido mis conclusiones son las siguientes:

- Muy importante, detectar lo antes posible que se trata de torsión de estómago, verificar que el perro quiere devolver y no puede (Como mucho algo de babas), palpar el estómago para detectar que esté hinchado, el perro no se quiere ni sentar ni echar etc.
- Contactar con urgencia con el veterinario para verificar los síntomas.
- Acudir a un centro donde intervengan al perro con garantías a la mayor velocidad.
- Nuestra perras comen siempre en 2 tomas al día para prevenir, siempre las bajamos en brazos de la mesa de peinar, e intentamos que después de comer no hagan un ejercicio excesivo, Pese a esto Caoba ha tenido Torsión de estómago, por lo tanto debemos estar prevenidos, pues aún sin los factores de riesgo vemos que esto puede ocurrir inesperadamente, conozco un caso del mismo día, en el cual otra perra cenó y la encerraron, con lo cual la perra no realizó ningún tipo de factor de riesgo, a la mañana siguiente su propietario se la encontró con Torsión y tuvo que acudir a toda velocidad al Hospital.

Ha día de hoy Caoba está perfectamente y se siente ella todo poderosa, vamos que si la dejamos se come el mundo, por suerte todo ha salido bien y esperamos que no tengamos que repetir la experiencia.

Alcañiz a 17 de Abril de 2010

Los3Sauces